

Скрининг рака ротовой полости, головы и шеи



Скрининг рака

МОЖЕТ СПАСТИ ЖИЗНЬ

РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА увеличивает Ваши шансы на выживание более чем в два раза

ФАКТОРЫ РИСКА

ТАБАК

Употребление любых табачных изделий способствует развитию рака головы и шеи

АЛКОГОЛЬ

Употребление любого алкоголя повышает риск развития рака полости рта, горла и гортани

ВОЗДЕЙСТВИЕ СОЛНЦА

Основная причина развития рака губы

ВИРУС ПАПИЛЛОМЫ ЧЕЛОВЕКА (ВПЧ)

Около 70% случаев рака ротоглотки (задней части горла, включая основание языка и миндаины) связаны с ВПЧ. Это распространенный вирус, который передается половым путем.

ИНФИЦИРОВАНИЕ ВИРУСОМ ЭПШТЕЙНА-БАРРА

Повышает риск развития злокачественных опухолей носа, полости носа (за носом) и слюнных желез



ФАКТЫ

**550
ТЫС.**

Во всем мире ежегодно диагностируется более 550 тысяч новых случаев рака полости рта, головы и шеи

2X

Эти виды рака встречаются более чем в два раза чаще у мужчин, чем у женщин

40+

Люди старше 40 лет подвержены более высокому риску развития этих видов рака, но данное заболевание может возникать и у людей более молодого возраста

ПРИМИТЕ НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ РИСКА РАЗВИТИЯ У ВАС ДАННОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СВОИМ ВРАЧОМ

СОКРАТИТЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ

НЕ КУРИТЕ И НЕ УПОТРЕБЛЯЙТЕ ТАБАЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ В КАКОМ-ЛИБО ВИДЕ

ЕСЛИ ВАМ МЕНЬШЕ 46 ЛЕТ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СВОИМ ВРАЧОМ ПО ПОВОДУ ПРОВЕДЕНИЯ ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ ВПЧ

Вакцина против ВПЧ наиболее эффективна при введении до инфицирования ВПЧ.

РЕГУЛЯРНО ПОСЕЩАЙТЕ СТОМАТОЛОГА

Эти виды рака могут не обнаруживаться до момента проявления связанных с ними проблем. Иногда соответствующие изменения выявляются во время обычного посещения врача или стоматолога

Источник: Центры по контролю и профилактике заболеваний и Американское онкологическое общество

Более подробная информация о скрининге рака ротовой полости, головы и шеи приведена на сайте:

providenceoregon.org/ohncancerscreening

503-215-6014