

Evaluación de detección de cáncer de boca, cabeza y cuello



La evaluación de detección del cáncer

SALVA VIDAS

El DIAGNÓSTICO PRECOZ puede aumentar a más del doble sus probabilidades de supervivencia

FACTORES DE RIESGO

TABACO

Todos los productos derivados del tabaco están vinculados con el cáncer de cabeza y cuello.

ALCOHOL

Beber alcohol de cualquier tipo aumenta el riesgo de padecer cáncer en la boca, la garganta y la laringe.

EXPOSICIÓN AL SOL

Una causa importante de cáncer en los labios.

INFECCIÓN POR VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO (VPH)

Alrededor del 70 % de los cánceres en la orofaringe (parte posterior de la garganta, incluida la base de la lengua y las amígdalas) están relacionados con el VPH, un virus común de transmisión sexual.

EXPOSICIÓN AL VIRUS DE EPSTEIN-BARR

Aumenta el riesgo de cánceres en la nariz, detrás de la nariz y en las glándulas salivales.



DATOS

550 mil

En todo el mundo se diagnostican más de 550 000 casos nuevos de cáncer de la boca, la cabeza y el cuello cada año.

2X

Estos cánceres son el doble de comunes en los hombres que en las mujeres.

40+

Las personas de más de 40 años tienen un mayor riesgo de sufrir estos cánceres, pero también pueden ocurrir en gente más joven.

REDUZCA SU RIESGO

HABLE
CON SU
MÉDICO

LIMITE EL
CONSUMO
DE
ALCOHOL

NO FUME NI
CONSUMA
NINGÚN TIPO
DE TABACO

SI ES MENOR DE 46 AÑOS,
HABLE CON SU MÉDICO
SOBRE LAS VACUNAS
CONTRA EL VPH

La vacuna contra el VPH funciona mejor cuando se administra antes de una exposición al VPH.

VISITE AL DENTISTA
PERIÓDICAMENTE

Estos cánceres no suelen detectarse hasta que causan problemas. A veces, se perciben cambios durante una visita de rutina al médico o al dentista.

Fuente: Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y American Cancer Society

Para saber más sobre la detección de cáncer de boca, cabeza y cuello:

providenceoregon.org/ohncancerscreening

503-215-6014